




# ЭХИНОКОККОЗ

ПАРАЗИТАРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ВЫЗЫВАЕМОЕ ЛЕНТОЧНЫМИ ЧЕРВЯМИ РОДА ECHINOCOCCUS

## КАК РАЗВИВАЕТСЯ ЭХИНОКОККОЗ

ЧЕЛОВЕК ЗАРАЖАЕТСЯ, ПРОГЛАТЫВАЯ ЯЙЦА ВОЗБУДИТЕЛЯ

- ПРИ УПОТРЕБЛЕНИИ ПИЩИ ИЛИ ВОДЫ, ЗАРАЖЁННЫХ ФЕКАЛИЯМИ БОЛЬНОГО ЖИВОТНОГО
- ЧЕРЕЗ ГРЯЗНЫЕ РУКИ, ПОСЛЕ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО КОНТАКТА С БОЛЬНЫМ ЖИВОТНЫМ




ПОПАДАЯ В ПЕЧЕНЬ, ЛЁГКИЕ, МОЗГ, КОСТИ И ДРУГИЕ ОРГАНЫ, ВОЗБУДИТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗВИВАТЬСЯ И СО ВРЕМЕНЕМ ОБРАЗУЕТ КИСТЫ

КИСТЫ РАЗВИВАЮТСЯ ОЧЕНЬ МЕДЛЕННО (ДО 10 ЛЕТ), МОГУТ ДОСТИГАТЬ ОГРОМНЫХ РАЗМЕРОВ

## СИМПТОМЫ

МОГУТ ОТСУТСТВОВАТЬ МНОГО ЛЕТ

- КИСТЫ ПЕЧЕНИ- БОЛЬ, ДИСПЕПСИЯ, ЖЕЛТУХА
- КИСТЫ ЛЕГКИХ- БОЛЬ В ГРУДИ, КАШЕЛЬ И КРОВОХАРКАНЬЕ



## ДИАГНОСТИКА

- КТ, МРТ ИЛИ УЗИ
- ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

## ЛЕЧЕНИЕ

- ХИРУРГИЧЕСКОЕ
  - МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ (РЕЖЕ)
- НАЗНАЧАЕТ ТОЛЬКО ВРАЧ !**

## ПРОФИЛАКТИКА

- НЕ ТРОГАТЬ И НЕ ПРИМАНИВАТЬ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ (ЛИС, БЕЗДОМНЫХ СОБАК)
- МЫТЬ РУКИ С МЫЛОМ И ТЕПЛОЙ ВОДОЙ ПОСЛЕ КОНТАКТА С СОБАКАМИ И ПЕРЕД ЕДОЙ
- НАУЧИТЬ ДЕТЕЙ ПРАВИЛАМ МЫТЬЯ РУК, И БЕЗОПАСНОГО ОБЩЕНИЯ С СОБАКАМИ
- НЕ УПОТРЕБЛЯТЬ ПИЩУ ИЛИ ВОДУ, КОТОРЫЕ МОГЛИ БЫТЬ ЗАГРЯЗНЕНЫ ФЕКАЛИЯМИ СОБАК
- ОГРАНИЧИТЬ ЗОНЫ, ГДЕ РАЗРЕШЕН ВЫГУЛ СОБАК
- ПРЕДОТВРАТИТЬ ПОТРЕБЛЕНИЕ СОБАКАМИ ЗАРАЖЁННОГО МЯСА
- КОНТРОЛЬ ПОПУЛЯЦИИ БЕЗНАДЗОРНЫХ СОБАК
- СВОЕВРЕМЕННО ПРОВОДИТЬ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИЮ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
- НЕ ПОЗВОЛЯТЬ СОБАКАМ ПИТАТЬСЯ ГРЫЗУНАМИ И ДРУГИМИ ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ

